

التصنيفات طبقاً لوزارة الزراعة المصرية تحت رقم (٢٩٥) :



syngenta.

الكفاءة التامة في القضاء على أمراض البياض الدقيق



سينجنتا جندورش، ٣٠٣٦٣، ميني، بالمركز التجارى أركان مول مكتب رقم ٥١ - المدور ٥ - الشيش زايد - ٦٠٣٨٤٤٧٣٣ - تليفون: ٠٢٥٠٣٥٨٨٨٤٥٣ - فاكس: ٠٢٥٦٩٦٩٦٩٧٣

May 2022
[W.D.1018] 2013]

يقضى توپاس بكفاءة تامة على أمراض البياض الدقيقى التى تصيب الخضر و الفاكهة

الفترة ما قبل الحصاد	المعدل	الآفة	المحصول
٥ أيام أو راق / ٣ أيام ثمار	١٠ سم³ /.. الترمس	البياض الدقيق	عنب
٧ أيام	٢٥ سم³ /.. الترمس		كتنالوب
١٥ يوم	٢٥ سم³ /.. الترمس		فلفل
٢٣ يوم	٢٥ سم³ /.. الترمس		مانجو
١٤ يوم	٢٥ سم³ /.. الترمس		بسلة
١٤ يوم	٢٥ سم³ /.. الترمس		طماطم

متوفّر في عبواته المختلفة ١٠٠ سـم³ ، ٢٥٠ سـم³ ، ٥٠٠ سـم³ لتناسب كل الاحتياجات

طريقة الإستخدام:

توپاس يمكن إستخدامه بكافة وسائل الرش سواء الرشاشات الظهرية أو الموتورات أو تلك المحمولة على الجرارات.

القابلية للخلط:

توپاس يقبل الخلط مع معظم المبيدات إنتاج شركة سينجنتا الفطرية والحسيرية والأسمدة.
موصى بإستخدامه عالمياً ضد أمراض البياض الدقيقى في الخرشوف والفلفل والفراولة والنباتات الطيبة والعطرية.

الاحتياطات والتخزين:

- يحفظ المستحضر في عبواته الأصلية في مكان جاف جيد التهوية بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات والمواد الغذائية والأعلاف.
- تجنب ملامسة المادة المركزية للجلد وفي حالة حدوث ذلك يجب الإغتسال فوراً بالماء والصابون.
- تجنب إبتلاع المادة المركزية أو محلول الرش وكذلك يجب الإمتناع عن تناول الطعام والتدخين أثناء عملية الرش.
- يجب عدم تلوث مياه الترع والبرك بمحلول الرش.



syngenta.



مرض البياض الدقيقى في الطماطم



مرض البياض الدقيقى في العنب



مرض البياض الدقيقى في المانجو



مرض البياض الدقيقى في الخوخ



مرض البياض الدقيقى في التفاح



مرض البياض الدقيقى في القرعيات

أعراض الإصابة :

- تبدأ الأعراض عادة مع بداية العقد فى الشمار حيث تظهر مساحات صفراء باهتة كبيرة على السطح العلوي للأوراق المسنة يقابلها على السطح السفلى نموات قطرية دقيقة بيضاء إلى صفراء.
- تتحول هذه المساحات إلى اللون البنى وفي النهاية تجف الأوراق وتموت.

الوقاية والعلاج :

- رش توباس بمعدل ٢٥ سم٣ لكل ١٠٠ لتر ماء على لا تقل جرعة الفدان عن ١٠٠ سم٣ من المبيد « بمختلف آلات الرش ».

أعراض الإصابة :

- يصيب المرض جميع أجزاء النبات على هيئة بقع ذات مسحوق أبيض دقيقى على كلا سطحى الورقة و تتجمع الأوراق ويصبح لونها باهتاً.
- تنتشر الإصابة على الفرع و تصل إلى الأزهار والثمار والمحاليل مما يؤدى إلى تساقطها وتشوهها.

الوقاية والعلاج :

- رش توباس بمعدل ٢٥ سم٣ لكل ١٠٠ لتر ماء

الوقاية والعلاج :

أعراض الإصابة :

- تظهر الأعراض على هيئة بقع بيضاء دقيقة تنشر على الأوراق والأفرع ويزداد حجمها حتى تعم سطح الورقة مما يؤدى إلى تجدها وتحولها إلى اللون البنى ثم تجف وتموت.
- كذلك تتعرض الثمار لإصابة مماثلة كالتى تظهر على الأوراق وتعمر الثمرة كلها وتشوه وتجف.

الوقاية والعلاج :

- رش توباس بمعدل ٢٥ سم٣ لكل ١٠٠ لتر ماء

أعراض الإصابة :

- تظهر الأعراض على هيئة بقع بيضاء دقيقة على السطح السفلى ثم تنتشر على السطح العلوى وأعنق الأوراق حتى تعم سطح الورقة كلها و توجد كذلك على السيقان.
- تتحول البقع إلى اللون البنى ثم تجف وتموت الأوراق مما يؤدى إلى ضعف النبات وقلة المحصول.

الوقاية والعلاج :

- رش توباس بمعدل ٢٥ سم٣ لكل ١٠٠ لتر ماء على لا تقل جرعة الفدان عن ١٠٠ سم٣ من المبيد « بمختلف آلات الرش ».

لأنه مبيد فطري جهازى .. فإنه وقائى و علاجى .. لا يتأثر بالرطوبة والأمطار

لأنه سريع النفاذية .. فإنه يوقف و يمنع تكون هيفات الفطر المسبب للمرض و يمنع تجدد الإصابة

لأنه واسع المدى .. فإنه يقضى بكفاءة على أمراض البياض الدقيقى في التفاح و المانجو و الخوخ و العنب و القرعيات

أياً كان المحصول ، مهما كانت درجة الإصابة فإنه توباس